

## Hepeel® N

### COMPRIMIDOS • SOLUCIÓN INYECTABLE

#### Composición

Comprimidos: 1 comprimido contiene: Lycopodium D 3, Chelidonium D 6, China D 3, Nux moschata D 4 ana 30 mg; Carduus marianus D 2, Phosphorus D 6 ana 15 mg; Veratrum D 6 60 mg; Colocynthis D 6 90 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Lycopodium D 2, Chelidonium D 6, China D 2, Nux moschata D 3 ana 1,1 µl; Carduus marianus D 1, Phosphorus D 5 ana 0,55 µl; Veratrum D 5 2,2 µl; Colocynthis D 5 3,3 µl.

#### Indicaciones

Trastornos hepáticos funcionales primarios y secundarios, hepatopatías.

#### Contraindicaciones

Comprimidos: hipersensibilidad a la quinina. No debe utilizarse en personas con hipersensibilidad conocida a Carduus marianus (cardo mariano) o a otras plantas de la familia de las Compuestas. Al contener Chelidonium y Veratrum, no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia.

Solución inyectable: no debe utilizarse en personas con hipersensibilidad conocida a Carduus marianus (cardo mariano) o a otras plantas de la familia de las Compuestas. Al contener Chelidonium y Veratrum, no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia.

#### Reacciones adversas

Comprimidos, solución inyectable: en casos raros, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como, por ejemplo, alergias cutáneas o fiebre después de tomar medicamentos que contienen quinina. En estos casos, deberá consultar con su médico.

Advertencia: existe la posibilidad de una sensibilización a la quinina o la quinidina.

#### Interacciones

No se han descrito.

#### Posología

Comprimidos: en general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca.

Solución inyectable: en afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.

#### Presentación

Comprimidos: envase de 50 comprimidos.

Solución inyectable: cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.

#### Observaciones farmacológicas y clínicas

##### *Lycopodium (licopodio)*

Enfermedades de las vías hepáticas y biliares. Anorexia o bulimia y sensación de estar saciado con solo comer un poco. Meteorismo. Palidez facial con tinte amarillento.

***Chelidonium (celidonia)***

Cólicos biliares. Hepatopatías. Dolores subescapulares (lado derecho). Sabor amargo en la boca.

***China (corteza de quina)***

Anorexia. Adelgazamiento. Meteorismo. Hepatomegalia.

***Nux moschata (nuez moscada)***

Gastroenteritis. Meteorismo. Síndrome gastrocardíaco.

***Carduus marianus (cardo mariano)***

Daños hepáticos. Congestión portal. Cólico biliar. Hemorroides.

***Phosphorus (fósforo)***

Medicamento para afecciones parenquimatosas. Lesiones del parénquima hepático.

***Veratrum (vedegambre)***

Afecciones febriles. Gastroenteritis. Vómitos crónicos.

***Colocynthis (coloquintida)***

Dolores punzantes. Cólicos (el paciente se dobla de dolor).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Hepeel N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: disfunciones hepáticas de tipo primario y secundario, lesiones hepáticas, estados de irritación en colangitis y colecistitis, meteorismo, anorexia, numerosas enfermedades (eccema, poliartritis, etc.) en las que hay que estimular la función destoxicante del hígado. Resulta favorable intercalar Hepeel N de vez en cuando en todas las fases celulares. También se utiliza como medicamento coadyuvante en acné vulgar.

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.